



Dos bloques de masas m_1 y m_2 descansan en reposo sobre una cuña. El bloque de masa m_1 está dotado de una polea y está conectado al bloque de masa m_2 por una cuerda que pasa por una polea fija, como se muestra en la figura.



- Encontrar la relación entre las aceleraciones de las dos masas.
 - Si la masa m_1 se mueve hacia arriba con magnitud de aceleración $a_1 = 2,54 \text{ m/s}^2$, despreciando la fricción al deslizar,
1. encontrar m_2 , si se sabe que $\alpha = 67,4^\circ$, $\beta = 42,0^\circ$ y $m_1 = 2,95 \text{ Kg}$.
- Suponiendo ahora que el coeficiente de fricción cinética μ_c entre cada bloque y la cuña es igual a 0,153 e idéntico al coeficiente de fricción estática.
2. ¿Cuál es la aceleración a_{1r} que adquiere el bloque de masa m_1 ?
 3. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la masa m_1 ?
 4. ¿Cuál debería ser el coeficiente de roce cinético μ_{oc} entre los bloques y la cuña para que el sistema se pueda mover a rapidez constante?
- A la masa m_1 se le imprime una velocidad $v'_1 = 3,25 \text{ m/s}$ hacia abajo, como lo indica la figura, suponiendo que $\mu_c = \mu_{oc}$:



5. ¿Cuánto tarda esa masa en detenerse?
6. ¿Qué distancia recorre m_2 en ese tiempo?